

# Estimado (a) paciente:

Su médico le ha indicado un examen llamado **PET-CT 68Ga-DOTATATE** Para el éxito de su examen es importante que usted siga cuidadosamente estas indicaciones:



### **INDICACIONES**

- Debe tener un ayuno de 4-6 horas
- Una hora antes del examen beber 1 litro de agua, NO debe retener orina.
- Tomar sus medicamentos en forma habitual.
- Si usted consume Octreotide (Sandostatin®, Sandostatin LAR®) estos los debe suspender al menos 1 mes antes de su examen.

## Si el examen requiere uso de medio de contraste endovenoso:

- Para pacientes mayores de 70 años, o antecedente de enfermedad renal y/o diabetes debe realizarse estudio de creatinina. Si su médico tratante no se la dio, puede solicitarla y se enviará por mail (se acepta creatinina con máximo 30 días de antigüedad)
- Si usted padece de asma o a tenido alguna reacción adversa al medio de contraste yodado, deberá premedicarse 24 horas antes del estudio (Se le entrega una orden medica con los fármacos e indicaciones de dosis a tomar)



### **DIA DEL EXAMEN**

- Llegar a unidad de medicina nuclear 30 minutos antes de su procedimiento para realizar trámite administrativo previo.
- Acudir con cédula de identidad, orden médica y bono del examen.
- Debe traer todos sus exámenes previos (biopsias, RM, TC, PET-CT, exámenes de laboratorio, etc)
- Listado de medicamentos que se administra diariamente.
- NO traer joyas de ningún tipo.
- Debe disponer de al menos 3 horas para la realización del estudio.
- Puede durante la espera de su examen leer algún libro, escuchar música o estar con su teléfono celular (solo hasta pasar al equipo luego de eso dejara sus objetos personales en su casillero personal)



### **IMPORTANTE**

- Después de realizado el examen beber abundante líquido para ayudar a la eliminación del radiofármaco.
- Durante resto del día mantener distancia de por lo menos 2 metros con embarazadas y menores de edad.
- Si está o existe posibilidad de embarazo, informar a personal de imágenes.
- Si usted está amamantando, debe suspender la lactancia 24 horas después del examen.
- El radiofármaco es producido por una entidad externa al servicio, debido a esto, pueden presentarse inconvenientes que pueden provocar retraso en atención e incluso reprogramar el día de la realización del estudio.
- En caso de ser claustrofóbico informar a personal previo a realización de examen